



БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

изх. № 025

09.08 2021

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

**ДО
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК**

Относно: Ваш изх. № 17-01-186/3.08.2021 г. и проведена среща на 6.08.2021 г.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Във връзка с проведената на 6.08.2021 г. среща за обсъждане на предложения от Вас проект за анекс на НРД за медицински дейности 2020-2022, съгласно Ваш изх. № 17-01-186/3.08.2021 г. и постигнатите договорки, Ви изпращам писмено нашето становище.

1. Приемаме предложението чл. 338в, ал. 23 да се измени така:

„(23) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна, НЗОК заплаща за КП № 39, КП № 48 и КП № 104 цена 1400 лв. за случаите, представляващи потвърден случай на COVID-19 (положителен резултат при приемане за хоспитализация или от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или извършен тест за откриване антиген на SARS-CoV-2) (код 92191-01), съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19.“.

2. Не смятаме за необходимо в КП №№39, 48 и 104 да се изисква задължително изследване с код 87.41 Компютърна томография на гръден кош, при отчитане на пациенти с лабораторно потвърден COVID-19 (диагноза U07.1 COVID-19). Предлагаме в алгоритмите на изброените КП да се въведат критерии, при които по преценка на лекаря се назначава изследване с код 87.4 и следните конкретни текстове:

„1. В КП № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст:

1.1. В таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“, в частта „Основни диагностични процедури“ най-отгоре се добавя:

„**87.41 Компютърна томография на гръден кош
56301-00 Компютърна томография на гръден кош“

1.2. Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“, в частта „Изискване“, като последен абзац се добавя следното:

„При инфекция с COVID-19 основна процедура с код **87.41 Компютърна томография на гръден кош (56301-00 Компютърна томография на гръден кош) се извършва по преценка на лекуващия лекар, при спазване на следните критерии:

1. Конвенционална рентгенография на белите дробове е достатъчна като първи метод на избор при лабораторно потвърдени пациенти със симптоматика от страна на дихателната система;

2. КТ на гръден кош се провежда при лабораторно потвърдени пациенти със симптоматика от страна на дихателната система и негативен/неубедителен резултат от конвенционалната рентгенография;

3. Конвенционална рентгенография на белите дробове е достатъчна при симптомни, лабораторно непотвърдени пациенти;

4. КТ на гръден кош се провежда при средно и тежко болни пациенти, показващи белези на усложнение. Като се има предвид високата вероятност за влошаване на бъбренчата функция от приложението на йод-базирани контрастни материали, контраст-усилената КТ трябва да се преценява при анализ полза/risk. Контраст-усилените протоколи са показани при съмнение за БТЕ, системни емболии или хеморагии.

1.3. В т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблицата се добавя т. 3 със следното съдържание:

„3. „Компютъртомографски апарат/и на територията на населеното място с осигурен достъп за болницата 24 часа в денонощето“.

2. В КП № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“:

2.1. В таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“, в частта „Основни диагностични процедури“ най-отгоре се добавя:

„**87.41 Компютърна томография на гръден кош

56301-00 Компютърна томография на гръден кош“

2.2. „При инфекция с COVID-19 основна процедура с код **87.41 Компютърна томография на гръден кош (56301-00 Компютърна томография на гръден кош) се извършва по преценка на лекуващия лекар, при строги клинични индикации и съобразено отношение полза/risk:

1. Конвенционалната рентгенография на белите дробове е достатъчно информативна като първи метод на избор при лабораторно потвърдени пациенти със симптоматика от страна на дихателната система;

2. Компютърна томография на гръден кош при деца се провежда при лабораторно потвърдени пациенти с изразена симптоматика от страна на дихателната система и негативен/неубедителен резултат от конвенционалната рентгенография.

3. КТ на гръден кош при деца се провежда при клиника на усложнение на заболяването след изчерпване на възможностите на диагностични методи, неизползвани йонизиращо лъчение;

2.3. В т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на клиничната пътека“, в т. 2 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение на алгоритъма на пътеката, неналични на територията на лечебното заведение, изпълнител на болнична помощ“, в таблицата се добавя т. 4 със следното съдържание:

„4. Компютъртомографски апарат/и на територията на населеното място с осигурен достъп за болницата 24 часа в денонощето“.

3. В КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“:

3.1. В таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“, в частта „Основни диагностични процедури“ най-отгоре се добавя:

„**87.41 Компютърна томография на гръден кош

56301-00 Компютърна томография на гръден кош“

3.2. Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“, в частта „Изискване“, като последен абзац се добавя следното:

„При инфекция с COVID-19 основна процедура с код **87.41 Компютърна томография на гръден кош (56301-00 Компютърна томография на гръден кош) се извършва по преценка на лекуващия лекар, при спазване на следните критерии:

1. Конвенционална рентгенография на белите дробове е достатъчна като първи метод на избор при лабораторно потвърдени пациенти със симптоматика от страна на дихателната система.

2. КТ на гръден кош се провежда при лабораторно потвърдени пациенти със симптоматика от страна на дихателната система и негативен/неубедителен резултат от конвенционалната рентгенография;

3. Конвенционална рентгенография на белите дробове е достатъчна при симптомни, лабораторно непотвърдени пациенти;

4. КТ на гръден кош се провежда при средно и тежко болни пациенти, показващи белези на усложнение. Като се има предвид високата вероятност за влошаване на бъбренчната функция от приложението на йод-базирани контрастни материали, контраст-усилената КТ трябва да се преценява при анализ полза/риск. Контраст-усилените протоколи са показани при съмнение за БТЕ, системни емболии или хеморагии.“

3. Приемаме § 2. – за допълнение на приложение № 13 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансериизирани от лекар специалист“, в таблица „Заболявания при ЗОЛ от 0 до 18 г.“, след рубрика по МКБ-10 „Захарен диабет“, да се добави Рубрика по МКБ-10 „Неинсулинозависим захарен диабет“ в съответния ред.

С УВАЖЕНИЕ,
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

