



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Главен държавен здравен инспектор

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Вх. № 527
30.03.2020

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изх. № 62-00-9/19.03.2020г

ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

БУЛ. „АКАД. ИВАН ГЕШОВ“ № 15

ГР. СОФИЯ

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

БУЛ. „ВИТОША“ № 12, ЕТ. 6

ГР. СОФИЯ 1000

ПРОФ. АСЕНА СТОИМЕНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

ИНТЕРПРЕД - СТЦ

БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ“ № 36, ОФИС Б 602 ЕТ.6

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,

УВАЖАЕМА ПРОФ. СТОИМЕНОВА,

Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 в световен план и обявяване от Световна здравна организация на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на новия Коронавирус (SARS-CoV-2) по смисъла на Международни здравни правила (2005) се предприемат мерки на национално ниво, вкл. и по отношение на превенция и контрол на заболяването в частта провеждане на дезинфекционни мероприятия. В тази връзка следва да се спазват Насоките на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV и Временните насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения,

в контакт с 2019-nCoV на Световната здравна организация, публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и на Регионалните здравни инспекции.

В Насоките на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията е посочен минимален набор от лични предпазни средства (ЛПС) за използване при обслужване на пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV.

При положение, че се използват лични предпазни средства за дихателна защита за многократна употреба, се спазват изискванията на Наредба № 3/08.05.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ), ДВ бр. 43/14.05.2013 г. за обработка на болнично бельо, вкл. работно облекло, а именно:

- изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 90 °С за не по-малко от 20 минути;

- изпиране с хладка вода при температура 40-60°С с подходящи препарати с дезинфекциращо действие (биоциди), напр. такива, съдържащи натриев хипохлорит в подходяща концентрация (химио-термодезинфекция).

В процеса на химио-термодезинфекция се използват само биоциди, разрешени за предоставяне на пазара по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди или на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, при спазване на условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени на етикета.

Информация за биоцидите, за които има издадени разрешения се поддържа на интернет-страница на Министерство на здравеопазването, информацията се актуализира най-малко веднъж месечно.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ

Главен държавен здравен инспектор

